

Ein Beitrag
zur Anatomie und Physiologie
der Spinalganglien.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalrats

PROF. D^R. VON GUDDEN

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Pericles Vejas

aus Korfu.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Ein Beitrag
zur Anatomie und Physiologie
der Spinalganglien.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des

Herrn Obermedicinalrats

PROF. D^R. VON GUDDEN

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Pericles Vejas

aus Korfu.



München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

ΤΩΙ ΠΑΤΡΙ ΜΟΥ

ὁ γράψας.

In der vormikroskopischen Zeit ziemlich unbeachtet geblieben, sind die Spinalganglien bald nach Einführung der mikroskopischen Technik Gegenstand mannigfacher Erforschung geworden.

An der Erforschung beteiligten sich bedeutende Männer. Ein flüchtiger Blick auf das am Ende der Arbeit folgende Literaturverzeichniss lehrt das zur Genüge. Wenn trotzdem nicht viel über die Spinalganglien bekannt ist, so muß der Gegenstand selbst daran schuld sein. Er muß grofse, schwer zu überwindende Schwierigkeiten in sich bergen.

Einen Beitrag zur Aufhellung des Gegenstandes möge vorliegende Studie liefern.

Die Spinalganglien, Ganglia intervertebralia, Ganglia simplicia (Scarpa), Formatio gangliosa prima (Valentin), interessieren uns in zweifacher Hinsicht; in anatomischer und physiologischer.

Ueber die anatomischen Verhältnisse in den Spinalganglien liegt z. Z. eine grofse Anzahl von Abhandlungen vor. Es liegt nicht in meiner Absicht eine längere historische Auseinandersetzung und Kritik der in diesen Abhandlungen vorkommenden Angaben vorzunehmen. Indem ich für eine solche auf die Arbeiten von Polaillon⁽²⁷⁾, Key und Retzius⁽¹⁸⁾ und Freud⁽¹⁴⁾ verweise, muß ich mich begnügen, behufs Orientirung in der vorliegenden Frage nur Einiges anzuführen.

Bei der Untersuchung der histologischen Verhältnisse der Spinalganglien drängen sich drei Fragen von selbst auf. Sie betreffen:

- 1) Die Zahl der Fortsätze, die jede gangliospinale Zelle besitzt.
- 2) Die Richtung, die diese Fortsätze einschlagen.
- 3) Die Beziehungen der zutretenden spinalen Fasern zu den Ganglienzellen und deren Fortsätzen.

Der gegenwärtige Stand der ersten Frage, die wegen ihrer Wichtigkeit das am meisten umstrittene Terrain bildet, läßt sich kurz in der Angabe wiedergeben, daß, nach allgemeiner Annahme, die Zahl der Fortsätze der Spinalganglienzelle bei Fischen zwei beträgt, während bezüglich der Säugethiere, einige Forscher zwei, andere nur einen Fortsatz der Zelle zugeben.

Ich führe einige Forscher an, die auf Grund von Untersuchungen an Schnitt- und Zupfpräparaten die Meinung aussprachen, daß die gangliospinale Zelle bei Säugethieren einen Fortsatz besitze, daß sie »unipolar« sei. Axmann⁽²⁾ gibt an, daß er, neben der überwiegenden Mehrzahl der unipolaren, nur spärliche bipolare gesehen habe. Kölliker⁽²¹⁾ hat ausnahmsweise mehr als einen Fortsatz von jeder Zelle ausgehen sehen. Lieberkühn⁽²⁴⁾, Courvoisier⁽⁹⁾, Fränzel⁽¹³⁾, Stannius⁽³⁷⁾, Schramm⁽³⁵⁾ schließen sich dieser Angabe an. Bärensprung⁽³⁾ vergleicht den Bau der Spinalganglien mit dem einer Drüse, und sagt, daß die Nervenstämmchen, die aus dem Spinalganglion ausgehen, den Ausführungsgängen eines Drüsenläppchens vergleichbar, den durchtretenden sensiblen Fasern in peripherer Richtung sich anschließen. Schwalbe⁽³⁶⁾ tritt für die Unipolarität der Zelle entschieden ein und geht sogar soweit, in den Spinalganglienzellen, gegen den Austritt des Fortsatzes hin, die fibrillare Structur, wie sie Schultz und Deiters für die centralen Ganglienzellen beschrieben, erkennen zu wollen. Vulpian (nach der Angabe Sappey's⁽³³⁾)

hat bei Ratten ebenfalls unipolare Zellen gefunden. Rawitz⁽²⁹⁾ dehnte seine Untersuchungen fast über sämtliche Wirbelthiergattungen aus; er kommt zu dem Schlusse, daß die Zelle unipolar sei. Flemming⁽¹²⁾ endlich, dessen Arbeit die neueste mir bekannte ist, hat sein Augenmerk auf die feinere Anatomie der Zelle gerichtet; er gibt aber an, daß soweit seine Untersuchungen ihn dazu berechtigten, er nur unipolare Zellen annehmen könne. — Ranvier⁽²⁸⁾ selbst ist zu den Unipolaristen zu zählen, von denen er nur insofern abweicht, als er die Destination der aus der Spinalganglienzelle entspringenden einzigen Faser zugleich angibt (vergl. S. 8).

Die Unipolarität der Zelle wurde weiterhin von Bidder und Volkmann⁽⁴³⁾ und Beck (vergl. ¹⁶⁾) angenommen, und zwar auf Grund der Zählung der in's Ganglion ein- und von ihm austretenden Nervenfasern. Bidder und Volkmann fanden nämlich, daß das Verhältniß der dünnen Nervenfasern zu den dicken im Nerv, vor dem Eintritt in's Ganglion 1 : 50 beträgt, dagegen nach dem Austritt 4 : 1. Sie schlossen daraus, daß im Ganglion so viele dünne Fasern entstehen, daß die Zahl der eintretenden verzweihundertfacht wird. *) Beck fand alsdann, daß die Zahl der austretenden Fasern größer als die der eintretenden ist, und zwar um die Zahl der im Ganglion vorhandenen Zellen.

Bekämpft wird dagegen die Unipolarität von den Bipolaristen. Unter diese zählen Remak⁽³⁰⁾, Krause⁽²⁰⁾, Polak⁽²⁷⁾, nach welchem »les cellules ont deux ou plusieurs pôles«, Beale⁽⁴⁾, welcher angibt, »that all nerv-cells have at least two fibres in connexion with them«, Arndt⁽¹⁾ der sogar die Bildung jedes der zwei Fortsätze in die Zelle selbst verfolgen zu können geglaubt hat, Kutschkin⁽³⁸⁾ dem die

*) Man kann sich übrigens leicht denken, daß die im Nerv vor dem Eintritt in's Ganglion zu beobachtenden dünnen Fasern ebenfогut im Ganglion ihren Ursprung haben können, und daß sie nur statt der peripheren die centrale Richtung eingeschlagen haben.

bipolaren Spinalganglienzellen den centralen ähnlich zu sein dünkten, Thanhoffer⁽⁴⁰⁾, und Boffe⁽⁸⁾. Die zwei letzteren nehmen sogar an, daß die Zellen einen größeren in eine Nervenfasern sich fortsetzenden Ausläufer haben, und zahlreiche feinere die Verbindungen mit anderen Zellen eingehen. — Diesen muß ich Retzius⁽³¹⁾ anreihen, der zwar annimmt, daß aus der Zelle ein Fortsatz entspringt, diesen Fortsatz sich aber sogleich in zwei Schenkel spalten läßt, womit die im Grunde anatomisch unipolare Zelle, physiologisch den Stempel der bipolaren bekommt.

Zu den Bipolaristen gehören ferner, und zwar auf Grund der Zählung der ein- und austretenden Fasern — im Gegensatz zu den eben angeführten, die nur Zupf- und Schnittpräparate untersucht haben — Wagner⁽⁴⁸⁾, Holl⁽¹⁶⁾ und Stiénon⁽³⁸⁾. Wagner hat nur dem Eindrücke nach geurtheilt: er gibt an, daß die ein- wie austretenden Fasern in anscheinend gleichem numerischen Verhältnisse sich vorfinden; sie betragen ungefähr die Zahl der im Ganglien sich vorfindenden Ganglienzellen (etwa 250—400). Die Untersuchungen von Holl und Stiénon führten bei sorgfältiger Zählung zu dem auffallenden Ergebnisse, daß die ein- und austretenden Fasern, bis auf verschwindend kleine Unterschiede, sich in gleicher Anzahl vorfinden.

Soviel von der Beantwortung, die der ersten aufgestellten Frage zu Theil wurde. Was die weiteren zwei Fragen betrifft, so erhellt die Stellungnahme der Forscher aus Folgendem:

Die Unipolaristen lassen alle von den Spinalganglienzellen entspringenden Fasern in die Peripherie ziehen, und zwar ohne daß dieselben je in irgend eine nähere Beziehung zu den austretenden spinalen Fasern getreten sind. Nur Axmann und Ranvier weichen theilweise von dieser Annahme ab, indem der erstere einen Theil der gangliosspinalen Fasern in's Rückenmark ziehen läßt, und der andere den aus der Zelle entspringenden Fortsatz sich bald in eine durchziehende spinale

Faser gleichsam einsenken läßt, mit der er in die Peripherie sich begeben soll *).

Die Bipolaristen stimmen dagegen in der Annahme überein, daß der eine Fortsatz nach der Peripherie, der andere nach dem Centrum sich begeben. Nur Arndt hat angegeben, daß beide Fortsätze nach der Peripherie zu verlaufen. Unter den Bipolaristen besteht aber betreffs der dritten aufgestellten Frage ein wichtiger Zwiespalt. Die einen glauben nämlich, daß die Zelle für sich unabhängig vom Rückenmark die zwei Fortsätze besitzt, während die anderen sie nur als ein Schaltstück in den vom Rückenmark austretenden sensiblen Nervenfasern gelten lassen. **)

Nach allgemeiner Annahme tritt die motorische Wurzel in keine nähere Verbindung mit dem Ganglion ein.

Die physiologische Untersuchung hat lange nicht so viele Bearbeiter angezogen, wie die anatomische; dieser Umstand in Verbindung mit dem Mangel an einer zusammenhängenden Darstellung des auf dem physiologischen Gebiete Geleisteten, möge mich rechtfertigen, wenn ich die Angaben etwas ausführlicher wiedergebe, als es für den anatomischen Theil der Fall war.

In älterer Zeit, als vom physiologischen Experimente keine Rede sein konnte, riefen begreiflicherweise die eigenthümlichen Gebilde sonderbare Meinungen hervor. Willis⁽⁵⁰⁾

*) Bei der Ranvier'schen T-Faser handelt es sich somit um eine Verschmelzung, nicht um eine Theilung der Fasern. Eigenthümlicherweise ist es jedoch mitunter vorgekommen, daß man bei der Ranvier'schen Faser von Theilung gesprochen hat, was als eine Mißdeutung zu bezeichnen ist. Die einschlägige Stelle aus Ranvier's Werk lautet: »La signification de ces tubes en T est la suivante; les fibres nerveuses nées chacune d'une cellule distincte, marchent l'une vers l'autre; de telle sorte que la fibre nerveuse unique, qui résulte de leur fusion, possède des fibrilles provenant en proportion variée des deux cellules d'origine.

**) Ich liefs die sog. Spiralfaser ganz außer Betracht, da die eifrigen Verfechter ihres Vorkommens im Sympathicus selbst zugeben, daß sie in den Spinalganglien nicht vorkommt.

läßt z. B. in ihnen die Lebensgeister so lange verweilen, bis alle sich derart geordnet haben, daß jeder seinen weiteren Weg erwählen kann. Vieussens⁽⁴²⁾ meinte, die Lebensgeister würden in den Spinalganglien durch die Blutgefäße hergestellt, Lancisi⁽²¹⁾ hielten sie von Wichtigkeit für die Bewegung des Blutes und besonders der Nervenflüssigkeit.

Solchen Meinungen kann aber die heutige Wissenschaft keine ernste Bedeutung beimessen. Von größerem Interesse ist dagegen die, allerdings etwas sonderbar ausgesprochene Meinung Winslow's⁽⁵¹⁾, wonach die Spinalganglien kleine Gehirne sind, die aus Cortical- und Medullarsubstanz bestehen, und zwar ist sie insofern von Interesse als Winslow damit jedenfalls centrale Organe gemeint hat. In diesem Sinne sprachen sich aus Johnston, Tiffot, Monro, Scarpa und Bichat⁽⁸⁾, welcher aber in seiner Classification des Nervensystems selbst eingesteht, daß er über die ihnen in ihr gebührende Stellung nicht recht im klaren sei. Genannte Forscher hielten die fraglichen Gebilde für vom Gehirn unabhängig, jedoch ihm untergeordnet und mit der Function betraut, die Ausführung der vom Willen dictirten Bewegung zu sichern.

Auf den ersten Blick annehmbar, konnte diese Erklärung auf die Länge nicht befriedigen, da sie keinen experimentellen Nachweis aufzuweisen vermochte. Sie war ja nur eine Hypothese, die die Feuerprobe des Experimentes nicht bestanden hatte. Es wurde demzufolge leicht auf sie verzichtet, als man etwas besseres, oder wenigstens anscheinend besseres, an ihre Stelle setzen konnte. Nachdem nämlich die bipolaren Ganglienzellen bei den Fischen entdeckt waren, und diese Entdeckung auch als für die Spinalganglienzellen der Säugethiere geltend betrachtet wurde, glaubte Wagner u. A. daß die Spinalganglien Filialanstalten des Rückenmarks seien, denen obliegt, die oft minimalen, auf dem langen Wege von der Peripherie nach dem Centrum abgeschwächten Eindrücke neu zu bekräftigen und so lebhafter dem Rückenmark zuzu-

schicken. Aber auch diese neue Hypothese stützte sich nicht auf Experimente.

Es war nun Waller⁽⁴⁶⁾ vorbehalten, den ersten Anstoß zu einer wirklich wissenschaftlichen Untersuchung der physiologischen Einrichtungen in den Spinalganglien zu geben. Die Resultate, die seine epochemachende Methode in ihrer genialen Einfachheit lieferte, waren ganz neu, die Erklärung sah überaus ungezwungen aus. Man darf sich also nicht wundern, daß seine Ergebnisse sich rasch Bahn gebrochen haben, daß sie heutzutage als die allein annehmbaren gelten.

Waller, der Katzen und Hunde zu seinen Experimenten verwendete, benützte die eigenthümliche Lage des II. Cervicalganglions, um seine Versuche so rein als möglich anzustellen. In dieses Ganglion nämlich ist man im Stande einzudringen, ohne den Rückenmarkskanal zu öffnen, und dann je nach Belieben eine der beiden Wurzeln, oder beide, oder auch den austretenden Stamm zu durchreißen bezw. zu durchschneiden. Waller machte nun verschiedene Schnitte theils zwischen Ganglion und Rückenmark, also an den Wurzeln – und zwar betraf der Schnitt entweder beide oder die eine derselben – theils an dem austretenden Stamm, und gelangte zu folgenden merkwürdigen Beobachtungen, die er in zwei einander ergänzenden und nur in einem Punkte von einander differirenden Noten wiedergeben hat: wird der Schnitt zwischen Ganglion und Rückenmark und zwar an der sensiblen Wurzel ausgeführt, so gehen die centralen Fasern, d. i. diejenigen, die mit dem Rückenmark in Verbindung bleiben, zu Grunde, während die peripherischen, also diejenigen, die das Ganglion mit der Peripherie verbinden, normal bleiben. Normal bleiben außerdem die gegen das Centrum gerichteten, in Verbindung mit dem Ganglion gelassenen Faferstümpfe(*). Wenn aber der

*) Dieser ist der Punkt, in welchem wie angegeben die Noten von einander differiren. In der ersten Note wird nämlich angegeben, daß die centralen mit dem Ganglion in Verbindung gebliebenen Fasern atrophiren, und daß man

Schnitt an der motorischen Wurzel gemacht wird, ist das Resultat ein ganz anderes als das eben für den Schnitt an der sensiblen Wurzel angegebene: es atrophieren nämlich bei diesem Schnitt nicht die centralen Fasern, sondern die peripheren, während die centralen normal bleiben. Auch beim Durchschneiden des austretenden Stammes beobachtete Waller immer, daß der periphere Stamm atrophirt. Ueber das Schicksal des centralen Stumpfes und namentlich des Ganglions läßt er uns leider, was den letzten Fall betrifft, im Ungewissen, worauf ich als auf eine sehr empfindliche Lücke des Berichtes über seine Untersuchungen aufmerksam machen muß. Allerdings wird die Lücke durch die Schlüsse, die er aus seinen Untersuchungen zieht, so ziemlich ausgeglichen; es wäre aber jedenfalls am besten, wenn sie überhaupt nicht vorhanden wäre.

Nachdem Waller das Experiment in verschiedenen Modificationen wiederholt hatte (der kurze Bericht sagt leider ohne nähere Angabe der Variationen einfach „*en variant l'expérience de différentes manières*“) glaubte er sich zu der Annahme berechtigt, daß die Hauptrolle in diesen Erscheinungen trophische Functionen und Centren spielen. Er verlegte alsdann das trophische Centrum der motorischen Nerven in's Rückenmark selbst und speciell in die Vorderhornzellen, während er als trophisches Centrum der sensiblen Fasern die Spinalganglien in Anspruch nahm. Es bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung, um zu zeigen, daß zu den angeführten Resultaten diese Erklärung ganz gut paßt.

Mehrere haben diese Experimente Waller's wiederholt, und alle sind in merkwürdiger Uebereinstimmung zu denselben Schlüssen gekommen, die Waller aus seinen Experi-

sie sogar bis zu einer gewissen ebenfalls atrophirten Ganglienzellengruppe verfolgen könnte. Ich mußte aber im Text die Angabe referiren, nach der sie erhalten bleiben, erstens weil sie in jüngerer Zeit erfolgt ist, und zweitens, weil sie zu der Annahme der „bipolaren Einwirkung“ unbedingt notwendig ist.

menten gezogen hat. Schiff^{*)}, Bidder⁽⁵⁾ und Stiénon (nach eigenen Experimenten) nehmen sie unbedingt an. Pathologische Beobachtungen und ein Mißverständniß (vergl. S. 21) gefellten sich hinzu, um die Glaubwürdigkeit der Schlüsse zu erhöhen und ihnen die allgemeine Annahme zu sichern. Heutzutage sind sie als Lehrfatz in den Lehrbüchern der Physiologie zu treffen^{**)}).

Kurz nachdem Waller seine erste Note der Oeffentlichkeit übergeben hatte (1851), trat Axmann (1853) ⁽²⁾ auf, der in einer Reihe sehr sorgfältiger Untersuchungen und mit Zuziehung der Literatur die Kenntnisse über die physiologische Rolle der Spinalganglien zu fördern sich vorgenommen. Es scheint aber, daß die Arbeit Waller's ihm unbekannt geblieben ist, da er in seiner längeren Abhandlung nicht eine entfernte Anspielung auf die kurze Note Waller's macht.

Die Untersuchungen Axmann's wurden in verschiedener Weise vorgenommen und zwar immer beim Frosch. 1) Er extirpirte Gehirn und Rückenmark (natürlich bei Erhaltung der Med. oblongata) und constatirte das Fortbestehen der normalen Ernährung der Gewebe. 2) Er schnitt den aus dem Ganglion austretenden Nervenstamm zwischen Ganglion und Ramus commun. durch, und zwar that er das an den Nerven der unteren Extremität; er beobachtete große Veränderungen, die in Verbleichung der Haut, Erweichung und Zerreißbarkeit der Gewebe bestanden, und in deren Gefolge Extravasate, Auflösung und Verminderung der Blutkörperchen, Cession der Secretion der Galle und des Urins, Wässerfucht mit Harnsäure und Gallenfarbstoff der hydropischen Flüssigkeit auftraten. Er schloß daraus, daß die Spinalganglien der Ernährung und der Secretion vorstehen, — da Rückenmark und Gehirn, welche bei der Durchschneidung des peripheren Nerven eben-

*) von Erb, Krankh. des Nervensystems, in Ziemsen's Handl. der spec. Path. angegeben.

**) verg. Landois Lehrb. der Physiol. II. Aufl. S. 652.

falls ausgeschaltet werden nach 1) von keinem Einfluß auf die Ernährung find. Den aus 2) gezogenen Schlufs sah er noch durch 3) und 4) bekräftigt. 3) Bei Durchschneidung der Rami communicantes — in welchen nach diesem Autor Fasern vom Sympathicus zu den Spinalganglien und den centralen Organen, wie andererseits von diesen zum Sympathicus verlaufen sollen — traten Veränderungen in der Ernährung der Unterleibsorgane auf. 4) Durchschneidung der cerebrospinalen Nerven dicht unter dem Zutritt der R. comm. bedingte ebenfalls Unregelmäßigkeit des Blutlaufs, Schwund der Strahlen der Pigmentzellen, Blasenbildung der Epidermis etc.

Diese wichtigen von Axmann angegebenen Thatfachen erfuhren leider das traurigste Schicksal, welches Forschungen widerfahren kann, sie wurden einfach todtgeschwiegen. Nur Lothar Meyer *) trat einem Punkte der Axmann'schen Angaben entgegen, der die Strahlen der Pigmentzellen betraf. Sie wurden sozufagen von den Waller'schen Angaben einfach überflügelt, und sind eigentlich nie zur Geltung gekommen.

Und doch hätten diese Angaben sehr leicht bekannt werden können. Kurze Zeit nachher fanden sie nämlich eine pathologische Illustration in v. Bärensprung's ⁽³⁾ Beobachtungen bei Herpes zoster. Genannter Forscher fand bei einem mit Herpes zoster, der das Verbreitungsbezirk der 6—8 Intercostalnerven betraf, behafteten, an Tuberculosis gestorbenen Knaben rosige Färbung des Neurilems der betreffenden Nerven diesseits der Spinalganglien, und die Spinalganglien selbst pathologisch verändert. Es stimmt das nun mit den Axmann'schen Experimenten vortrefflich überein, weil wir hier Störungen in der Ernährung der Haut wahrnehmen, durch die auf pathologischem Wege stattgefundene Ausschaltung der physiologischen Function der Spinalganglien.

Die Beobachtung v. Bärensprung's, der nebenbei gesagt, als Ursache der Naevi pigmentosi eine im foetalen Leben

*) In Virchow's Arch. Bd. 6.

stattgefundene Erkrankung der Spinalganglien anfieht, wurde von mehreren Forschern wiederholt bestätigt und es wurden keinerlei Bedenken dagegen erhoben. Erst in der allerjüngsten Zeit ist angegeben worden, daß Herpes auf der Haut nach Traumen des Rückenmarks, bei welchen die Vorderhörner am meisten leiden, entstehen. Diese Angabe, die von Irfai und Babes in Buda-Pest⁽¹⁷⁾ stammt, ist von der größten Wichtigkeit, da sie ein eigenthümliches Streiflicht wirft auf eine scheinbar abgeschlossene Frage, die die trophischen Centren der motorischen Fasern im Rückenmark betrifft.

Wie es aus der anatomischen Einleitung erhellt, ist man über die Hauptfragen noch nicht einig und wird zu einer Einigung so bald wohl noch nicht kommen. Die reine mikroskopische Untersuchung hat bis jetzt entschieden im Stich gelassen; sie hat es durch ihre einander widersprechenden Ergebnisse dazu gebracht, eine schwer auszufüllende Kluft zwischen den verschiedenen Meinungen zu öffnen. In Anbetracht dessen hielt ich für angezeigt, in der Lösung dieser Fragen die experimentelle Methode zu Hülfe zu nehmen, wie ja bekanntlich bei anatomischen Forschungen das Experiment vielfach zu Hülfe genommen wird.

Dies Experiment benützte ich zugleich zur Erforschung der physiologischen Verhältnisse.

Zwei, wenige Tage alten Kaninchen wurde der Rückenmarkskanal geöffnet, und zwar indem man durch entsprechende Schnitte das hintere Bogenstück der 10—12. Wirbel ablösen und umklappen konnte. Das Rückenmark wurde oben und unten durchschnitten und dann ohne Schwierigkeiten entfernt. Bei der Entfernung rissen die Wurzeln aus, die dem zufolge mit ihren Ganglien zurückgeblieben waren. Nach vollzogener Operation, zu der keine Narkose nöthig ist, da die Thierchen in diesem Alter sehr wenig Empfindung zu Tage legen, wurden

sie der Sorge der Alten übergeben, die bekanntlich die in den ersten Lebenstagen auch sonst hilflosen Jungen mit grosser Sorgfalt pflegen.

Die Thierchen waren in Folge der Operation der motorischen Kraft und der Empfindung an den hinteren Extremitäten verlustig gegangen; dagegen ging sowohl die Urinsecretion als die Kothentleerung weiter normal von Statten, da deren Centren bekanntlich im Lendenmark sich befinden.

Als man die Thiere etwa nach einem Monat untersuchte, konnte man folgendes bemerken: Bei dem Versuche sich fortzubewegen, setzten die Kaninchen die noch dem Willen untergebenen vorderen Extremitäten vor, die hinteren dagegen blieben wegen der angeführten Einbusse an Motilität ruhig. Letztere wurden nur, wie man sich leicht denken kann, beim Vorsetzen der vorderen Extremitäten leicht gestreckt. Die Rumpfmuskeln zogen alsdann das gelähmte Hintertheil, um es den vorderen Extremitäten anzunähern. In dem Momente, wo dieser Zug ausgeführt wurde, fand eine leise Andeutung einer Zuckung an den gelähmten, etwas gestreckten hinteren Extremitäten statt, die aber ohne jeglichen Einfluss auf die Fortbewegung war. Wenn man das Thier dann am Kopfe fasste und hob, so dass die Extremitäten ohne Stütze blieben, sah man, dass bei Ruhigbleiben der in normalen Zustände befindlichen vorderen Extremitäten, die hinteren in starke Zuckungen geriethen, die mit der Regelmässigkeit einer Maschine vor sich gingen. Stützte man die eine Extremität, so blieb sie still während die andere fortzuckte. Man konnte ebenfalls letztere durch Stützen zur Ruhe bringen. Es muss aber hervorgehoben werden, dass der stützende Finger keinen Druck verspürte, wie es etwa bei einem Versuch die Zuckung fortzusetzen, zu erwarten wäre. — Wenn man das Thier mit dem Bauch nach oben gekehrt auf der Hand hielt, so blieben alle vier Extremitäten ruhig, streckte man eine der hinteren, so zog sie sich jedesmal energisch zusammen. — Da nun, wie mir die Section ergab, keine Ver-

wachfung zwischen den zwei Rückenmarksstümpfen erfolgt war, dürften obige Erscheinungen in dem Sinne ausgelegt werden, daß durch den Zustand der hinteren Extremitäten, welche in der nach der Operation verfloffenen Zeit gelähmt waren, eine derartige Modification in den Einrichtungen des mit dem Gehirn nicht in Verbindung stehenden Rückenmarks bedingt wurde, daß die Streckung ihrer Muskel als Reiz zur Auslösung reflectorischer Bewegungen wirken konnte. — Weiterhin konnte man beobachten, wie durch leichtere Reizungen, Kitzeln etc. reflektorische Bewegungen ausgelöst werden konnten und wie auf stärkere Reize, wie Kneifen etc., lebhaftere Abwehrbewegungen sogar mit dem Ausdrucke des Schmerzes eintraten, so daß man sich lebhaft an die Experimente mit dem decapitirten Frosch erinnern mußte.

Die angeführten Thatfachen sind übrigens Hr. v. Gudden schon seit einer längeren Reihe von Jahren bekannt, und wurden bei Gelegenheit meiner Untersuchungen höflichst von ihm wieder konstatirt. —

Die Versuchsthiere wurden erst getödet, als die nachlassende Sorge der Alten und ihr eignes Unvermögen wegen der Lähmung sich selbst rein zu halten, es für wünschenswerth erscheinen liefs. — Die Section ergab, daß keine Verwachsung der Rückenmarksstümpfe eingetreten war; weiterhin daß die Ganglien, die beim Entfernen des Rückenmarkes zurückgeblieben waren, etwas kleiner waren als die normalen. Weder am Rückenmark, noch an der dem Rückenmarke zugekehrten Seite der Ganglien war ein Ueberbleibsel von Fasern zu sehen. In der peripherischen Richtung ging von den Ganglien ein dünner weißer Nerv ab. — Die Ganglien wurden zum Theil mit Osmium behandelt, zum Theil in chromsauren Kali gehärtet und mit Carmin gefärbt. Die mikroskopische Untersuchung der so behandelten Ganglien ergab zunächst den Grund der Verkleinerung, indem sie dieselbe auf die völlige Abwesenheit der durchziehenden motorischen Fasern und der zutreten-

den sensiblen Fasern zurückführte. Weiterhin liefs sie den an dem Ganglien abgehenden dünnen Nerv als aus ganz normalen dünnen Fasern bestehend erscheinen. Im Durchschnitte sah man wie sie aus den Zellen zu Bündelchen zusammenliefen. Von buntem Durcheinander der Fasern war in diesen Schnitten nichts zu sehen. Die Zellen selbst zeigen die normale Gröfse und sonst auch keinen Unterschied von Schnitten normaler Ganglien desselben Thieres. Dies Unverändertbleiben der Zellen ist besonders wichtig und mufs demzufolge auch festgehalten werden.

In einer zweiten Reihe von Versuchen wiederholte ich an erwachsenen Kaninchen, bei denen die zur Operation erforderlichen günstigen Umstände auch vorhanden sind, die eigentlichen Waller'schen Experimente.

Die Operation ist ziemlich einfach. Man schneidet am Nacken (zweckmäfsig bei Aethernarkose) die Haut des Kaninchens unterhalb der Protub. occip. ext. durch und dringt allmählich hinunter. Man sucht den Fortsatz des Epistropheus zu gewinnen, und arbeitet, bis er frei da liegt. Dann schiebt man die Muskulatur, die auf den Platten des Epistropheus liegt stumpf hinunter, und man gelangt in der Weise auf das zwischen Epistropheus und Atlas austretende Ganglion. Nunmehr kann man entweder eine Wurzel oder beide, oder auch den austretenden Stamm durchreißen, bezw. durchschneiden. Das einfache Durchschneiden hat den Nachtheil, dafs die zwei Stümpfe sich gegeneinander legen können und wieder verwachsen, was der Reinheit des Experimentes Eintrag thun könnte. In dieser Beziehung sind mir selbst die ursprünglichen Waller'schen Experimente verdächtig, da Waller von Regeneration bei einer Gelegenheit spricht, wo von einer solchen kaum die Rede sein dürfte (vergl. die erste Note). Davor bewahrt jedenfalls die Vorsicht das Schnittende umzubiegen und irgendwohin zu stecken, wo es nicht leicht mit dem anderen in Berührung kommen kann.

Viel ficherer aber ist die Durchreißung, die dagegen das Unangenehme hat, daß durch die bei derselben anzuwendenden Gewalt leicht Verletzungen eintreten können. Es ist dies auch in meinen Untersuchungen in der That einmal vorgekommen, was mich veranlaßt hat, den betreffenden Fall ganz zu cassiren. — Man näht dann die behufs sicheren Operirens umfangreich gemachte Wunde wie gewöhnlich zu.

Meine Ergebnisse stimmen im Großen und Ganzen mit den Waller'schen überein, nur habe ich ergänzende Beobachtungen mitzutheilen, die der Sache aber anderes Aussehen verleihen. (Waller gibt an, daß er die Thiere nach 10—12 Tagen tötete, ich that es nur theilweise, und liefs sie größtentheils viel länger, bis zu 2 Monaten leben.)

Erstens: ich beobachtete, daß constant in allen Fällen, wo beide Wurzeln abgerissen worden sind, die aus dem Rückenmark zurückgelassenen Stümpfe, sowohl der hintere, wie auch der vordere, vollständig verschwunden waren. Zweitens: ich war nicht glücklich genug am Ganglion selbst Ueberbleibsel von erhaltenen sensiblen Fasern mit der Richtung nach dem Centrum zu treffen. Da nun aber das Experiment öfters vorgenommen wurde und die Erscheinung nie zu Tage trat, sehe ich mich veranlaßt gegen die betreffende Angabe eine ablehnende Haltung einzunehmen. Drittens: das Ganglion selbst bleibt bei Durchschneidung der Fasern zwischen ihm und Rückenmark — entweder nur der sensiblen oder der motorischen und sensiblen — wohl erhalten: dagegen geht es bei Durtrennung der peripherischen Fasern zu Grunde. Waller hat den zweiten Theil dieser dritten Beobachtung (Erhaltung des Ganglions bei peripherer Durchschneidung der Nervenfasern) nicht angegeben.

Endlich bot mir ein glücklicher Zufall Gelegenheit zur Untersuchung des Ganglions Gasseri eines Kalbes, bei welchem durch abnorme Entwicklungsvorgänge der rechte Trigeminus gar nicht zur Entwicklung gekommen war. Das

Ganglion Gasseri befand sich ohne jegliche Kommunikation mit dem Gehirn und sendete Fasern nach der Peripherie ab. Ich untersuchte, von den durch diese Fasern gebildeten Nerven, den Infraorbitalis, der ein ansehnliches Bündelchen darstellte. Die mikroskopische Untersuchung (Behandlung mit Osmiumsäure) ergab, daß dieser Nerv, der im Vergleich mit dem normalen Infraorbitalis der anderen Seite beträchtlich dünner war, und zugleich grau ausah, vollständig normale Fasern enthielt, die nur den Eindruck machten, als wären sie von kleineren Kaliber, als die des Infraorbitalis der anderen Seite. Die Fasern waren in Bündelchen angeordnet, die von einander durch reichliches Bindegewebe getrennt waren. Das Ganglion selbst bestand aus ganz normalen Zellen, wie das, welches mit dem Trigeminus in Verbindung stand. — Das pathologische Vorkommniß muß als eine sehr schöne Wiederholung der oben angeführten Experimente bei Kaninchen gelten, da man, und zwar höchst wahrscheinlich mit Recht, dem Ganglion Gasseri, welches denselben Bau besitzt wie die Spinalganglien, eine vollständige gleiche Rolle zuschreibt, wie diesen letzteren Gebilden.

Aus der historischen Uebersicht des auf dem physiologischen Gebiete Geleisteten geht hervor, daß z. Z. zwei Ansichten über die physiologische Rolle der Spinalganglien vorliegen. Dieselben stehen in scheinbarer Uebereinstimmung da, in Wirklichkeit aber befinden sie sich in schroffem Gegensatz zu einander. Sowohl die Waller'sche wie die Axmann'sche Ansicht befaßt nämlich, daß wir in den Spinalganglien ein trophisches Centrum zu suchen haben. Sie differiren aber bedeutend in der Angabe des Gewebes, welches Gegenstand dieser trophischen Einwirkung sein soll.

Nach Axmann begeben sich die in den Spinalganglien entspringenden Fasern größtentheils in die Peripherie, wo sie

die Ernährung der peripherischen Gewebe, also der Haut etc. besorgen müssen. Pathologische Zustände in diesen Fasern würden eine anomale Ernährung zur Folge haben. Damit stimmt die Beobachtung v. Bärensprungs, wie angegeben, vollkommen überein.

Es könnte sogar noch Folgendes zu Gunsten der Axmann'schen Hypothese angeführt werden, worauf meines Wissens noch Niemand aufmerksam gemacht hat. — Allgemein bekannt ist die Controverse über die trophischen Eigenschaften des Ganglion Gasseri: einerseits hält man die nach Durchschneidung des Trigeminus nach dem Austritt vom Ganglion eintretenden Veränderungen für vom Wegfall der trophischen Einwirkungen des Ganglions abhängig, andererseits stellt man jegliche trophische Einwirkung dieses Gebildes vollständig in Abrede, indem man die am Auge eintretenden Verheerungen auf Rechnung der erloschenen Sensibilität setzt. Wie dem nun auch sei, eins muß ich betonen, daß, wenn man dem Ganglion Gasseri eine trophische Einwirkung zuerkennen und eine Analogie daraus für die Funktion der Spinalganglien ziehen will, man keineswegs berechtigt ist, das zu Gunsten der bald zu besprechenden Waller'schen Ansicht zu thun, wie es ausschließlich geschehen ist, sondern nur zu Gunsten der Axmann'schen Ansicht. Wenn nach Durchschneidung des Trigeminus nach deren Austritt aus dem Ganglion wirklich trophische Störungen eintreten, kann man, wenn man der Ansicht Axmann's beitrifft, das ganz gut durch den Wegfall der trophischen Einwirkungen der Nerven erklären. Daß man dagegen dies in keiner Weise für die Waller'sche Ansicht verwerthen kann, wird aus Folgendem leicht ersichtlich sein.

Ich gedenke der Axmann'schen Ansicht keine Erörterung zu Theil werden zu lassen, da, wie in der historischen Uebersicht schon angegeben worden ist, sie eigentlich nie zur Geltung gekommen ist. Neuerdings scheint Weis's⁽¹⁹⁾, dessen Arbeit

mir leider im Original nicht zugänglich war, dieser Ansicht beigetreten zu sein, da er auch die trophischen Centren für die Haut in die Spinalganglien verlegt.

Ich unternehme dagegen die vorherrschende Ansicht, die Waller'sche, einer genauern Prüfung zu unterziehen, da ich bisher nicht erhobene Einwände gegen diese Ansicht geltend machen will.

Die Waller'sche Ansicht geht, im Gegensatz zu der eben besprochenen Axmann'schen dahin, daß die aus den Spinalganglienzellen austretenden Fasern eine trophische Einwirkung nicht auf die peripheren Gebilde, sondern auf die sensiblen Nervenfasern selbst ausüben. Richtiger sollte man eigentlich sagen, daß nach der Waller'schen Ansicht die im Verlauf der sensiblen Faser eingeschaltete gangliöse Anschwellung mit dem Dienste betraut ist, auf diese sensible Faser, als auf ein Gewebe des Körpers, eine trophische Einwirkung auszuüben, derart, daß, wenn ihre Einwirkung der sensiblen Faser abhanden kommt, letztere nicht mehr lebensfähig ist und demgemäß auch der Atrophie anheimfällt.

Der Unterschied in den zwei Ansichten, um es nochmals zu betonen, liegt also an der Verschiedenheit des in seiner Ernährung zu beeinflussenden Gegenstandes.

Die Waller'sche Ansicht hat, wie in der Einleitung angegeben, eine pathologische Illustration erfahren, die aber jedenfalls nicht so zweifellos liegt, wie die der Axmann'schen.

Nachdem Luys behauptet hatte, daß bei der Tabes spinalis die Spinalganglien die regressive Degeneration durchmachen und daß in den Ganglienzellen bei dieser Gelegenheit große Mengen von Fettkörnchen zu sehen sind, machten zunächst Charcot und Vulpian ⁽¹⁴⁾ dann Vulpian allein ⁽¹⁵⁾ die Beobachtung, daß die Sache sich nicht so verhält, daß nämlich die sensiblen Fasern nicht in ihrem ganzen Verlaufe degenerieren, sondern nur in der kurzen Strecke zwischen Ganglion und Rückenmark, während der periphere Stamm erhalten

bleibt, und das Ganglion vollständig unbetheiligt an den Degenerationsvorgängen erscheint. Das Ganglion würde somit in diesen Fällen, Dank seiner trophischen Eigenschaft, die diese Autoren annehmen und zugleich nachweisen wollen, das weitere Fortschreiten der Degeneration in ihrer Richtung vom Rückenmark und der Peripherie verhindert, ihr gleichsam eine „barrière infranchissable“ (nach dem Ausdruck Vulpian's) geboten haben. Dafs die Sache aber nicht so einfach und klar gelagert ist, konnte Vulpian nicht entgehen und er gesteht in weiterm Verlauf seiner Note seinen „embarras“ zu einer wirklich über alle Zweifel erhabenen Motivirung des Befundes. Dieselbe Beobachtung wurde weiterhin von Schüppel wiederholt, und neuerdings von Déjérine.*) Man findet sie sogar in der Schrift Arndt's, da er bei seinen Untersuchungen die Ganglien eines Tabetikers benützt hat, ohne von irgend einer Veränderung in ihnen zu sprechen.

Ich bin der festen Ueberzeugung, dafs dies Vorkommen bei der Tabes der Waller'schen Ansicht keine Stütze verleihen kann. (Vergl. S. 31.)

Ich gehe hierbei nicht auf die Controverse ein, ob die Nervenfasern eines Nährcentrums bedürfen, um fortleben zu können. Man könnte über die Berechtigung der Aufstellung von trophischen Centren für das Nervensystem wohl zu Genüge streiten. Da ich jedoch auf solche Meinungsverschiedenheiten mich nicht einlassen will, nehme ich als erwiesen an, dafs es wirklich Nährcentren für die peripheren Fasern des Nervensystems gibt.

Wir gelangen nunmehr zu der Frage: Wie soll man es sich vorstellen, dafs die Ernährung der sensiblen Fasern durch die gangliosspinalen beeinflusst wird. Darüber gibt es zweierlei Ansichten. Ich werde sie referiren, ohne weitere Bemerkungen daran anzuknüpfen. Waller ist, wie es aus seinen kurzen Berichten hervorgeht, der Ansicht, dafs die gangliosspinalen

*) Neurol. Centralbl. 1882, 7. Aus der Société de Biologie.

Zelle im Verlaufe der sensiblen Faſer ſich befindet, ſie gleichſam unterbricht und dadurch „une action bipolaire“ auf ſie ausübt. Sie beſorgt nämlich die Ernährung der Faſer ſowohl in ihrem Verlaufe im Rückenmark, wie auch in ihrem peripheren Verlaufe. Wird der periphere Theil durch Durchſchneidung des aus dem Ganglion austretenden Stammes vom Ganglion abgetrennt, ſo verfallen die peripheren Faſern der Degeneration; wird dagegen der centrale vom Spinalganglion abgetrennt, durch Schnitt zwiſchen Rückenmark und Ganglion, ſo verfallen die centralen Faſern der Degeneration. — Ranvier dagegen und Stiénon glauben, daß der trophiſche Einfluß der Spinalganglien auf die ſensible Faſern in der Form der T Faſer übertragen wird. Der aus der Zelle austretende Ausläufer begeben ſich in die Faſer, um ihr die trophiſche Einwirkung zu Theil werden zu laſſen. Dieſe Einwirkung müßte aber centripetal und centrifugal ſtattfinden, indem wahrſcheinlich der Axencylinder des Ausläufers ſich theilt und die zwei Richtungen einſchlägt.

Aber auch über die Art der Einwirkung ſtehen zwei Anſichten ſich gegenüber. Während Waller annimmt, daß die ernährende Faſer die zu ernährende durch Zufuhr von Material etc. ernährt, glauben Cl. Bernard und Ranvier andererseits, daß die Ganglienzellen inſofern von Wichtigkeit für die Ernährung der Faſern ſind, als ohne ſie eine zu lebhaſte Ernährung bei dieſen ſtattfinden würde, wobei die Kerne ſich auf Koſten der Nerven nähren ſollten etc. Sie ſtützen dieſe Anſicht auf Beobachtungen bei der nach Durchſchneidung auftretenden Nervendegeneration. Coffy und Dejerine*) geben allen dieſen Vorgängen eine andere Deutung, nähern ſich alſo der Waller'ſchen Annahme.

Ich ſagte bei der Mittheilung meiner Ergebniſſe, daß

*) Recherches sur la dégénérescence des nerfs séparés de leurs centres trophiques Archiv. de Physiol. 1875.

trotzdem sie nicht im schroffen Gegensatz zu den Waller'schen sich befinden, dennoch gar manches berechtigen dürfte, aus denselben einen anderen Schluß zu ziehen. Den angeführten, von den Waller'schen Resultaten abweichenden drei Punkten meiner Untersuchungen kann nämlich unmöglich eine Erklärung gegeben werden, die zu der ganzen Ansicht Waller's paßte und ihr keinen Eintrag thäte.

Schon der erste, d. i. die Constatirung der Thatfache, daß bei Durchschneidung, bezw. Durchreißung der Wurzeln zwischen Ganglion und Rückenmark die centralen Fasern beider Wurzeln atrophiren, steht mit feinen Consequenzen der Waller'schen Ansicht entschieden feindlich entgegen. Der Satz des Fortbestehens der centralen Fasern der motorischen Wurzel ist eine *conditio sine qua non* zur Aufrechthaltung des schönen Gebäudes, welches man auf den Waller'schen Angaben errichtet hat. Wenn ich behaupte, daß nach kurzer Zeit, von den centralen Fasern der motorischen Nerven am Rückenmark nichts zu sehen ist, stellt sich sofort der Zweifel ein, ob wirklich ein trophisches Centrum für die motorischen Fasern existire. Unbeschadet desselben, könnte doch wohl noch ein trophisches Centrum für die sensiblen Fasern in den Spinalganglien angenommen werden; die Theorie würde aber immerhin an ihrer Sicherheit verlieren. Es fragt sich aber mit Recht, können wir auf Grund des Zugrundegehens der centralen Fasern der motorischen Wurzel eine Ansicht ohne Weiteres von der Hand weisen, deren Annahme von einer großen pathologischen Casuistik befürwortet wird? Ist eine andere Auslegung der Thatfache nicht möglich? Ich denke wohl, sie greift aber bedeutend schärfer in die Waller'sche Ansicht ein. Man könnte die Sache sich folgendermaßen vorstellen. Das trophische Centrum für die motorischen Fasern, dessen Lage in den Vorderhornzellen durch zahlreiche pathologische Erfahrung als erwiesen gelten kann, schützt dieselben vor baldigem Zugrundegehen nicht. Es ist deshalb gerechtfertigt, daß wir die

trophische Kraft, welche die Fasern in dem Zeitraume des Experimentes bestehen läßt, auch dem hypothetischen, angeblich in den Spinalganglien gelegenen trophischen Centrum für die sensiblen Fasern, absprechen. Es gebricht vollständig an einem Grunde, um diesem Centrum eine grössere Energie und Zähigkeit zuzuschreiben. Eine Thatfache ist es aber und bleibt es, daß nach Durchschneidung der sensiblen Fasern zwischen Rückenmark und Ganglion, austretende Fasern aus dem Ganglion erhalten bleiben, solche dagegen bei der Durchschneidung des austretenden Stammes zu Grunde gehen. Diese Thatfache wird aus dem Angeführten nicht erklärt.

Es handelt sich eben bei dieser Erscheinung nicht um Bewahrung der sensiblen Fasern. Diese gehen in beiden Fällen entschieden zu Grunde. Es handelt sich im Gegentheil um die Erhaltung einer eigenen Fasergattung, die aus den Ganglienzellen entspringt. Blieben nämlich die sensiblen Fasern erhalten, so hätten wir keine Atrophie im austretenden Stamm zu verzeichnen, die aber doch vorkommt.

Zum zweiten Punkte führte ich an, daß ich gegen das Fortbestehen centralwärts gerichteter, mit dem Ganglion in Verbindung stehender sensiblen Fasern eine ablehnende Stellung einnehmen muß, da es gewiß anzunehmen ist, daß beim oft wiederholten Experimente das eine oder das andere Mal Fasern aus Ganglien zurückbleiben würden, die dann laut Angabe Waller's gesund angetroffen werden mußten. Aber selbst wenn ich zugeben wollte, daß ich keine normale centralwärts gerichtete Fasern gefunden habe, eben weil keine bei der Ausführung des Experimentes zurückgelassen wurden, treten zu meinen Gunsten die path. Beobachtungen auf. Es wurde nämlich bei den erwähnten Tabesfällen beobachtet, daß die Degeneration bis dicht an's Ganglion herantrat, was nicht mit den Waller'schen Angaben übereinstimmt. Diese Beobachtungen lassen mich meinen Einwand entschieden festhalten. — Aber dieses Moment fällt wiederum gegen die Waller'sche

Anficht schwer in die Wagfschale, da es fie einer bedeutfamen Stütze beraubt.

Es berührt mich fehr eigenthümlich, dafs Waller, wie angegeben, der in meinem dritten Punkte angegebenen Thatfache, d. i. der Erhaltung des Ganglions nach Trennung der Wurzeln und Zugrundegehens derfelben nach Trennung des peripheren Stammes keine Erwähnung thut. Letzteres befonders ift von durchfchlagender Bedeutung. Wenn er nämlich fagt, die Zelle übe ihre trophifche Einwirkung nach beiden Richtungen, jedoch das Ganglion bei peripherer Durchfchneidung zu Grunde geht, fo hat man volles Recht zu entgegnen, dafs dies Gebilde den centralen Fafern gegenüber fich fehr ftiefmütterlich verhält, — wofür aber kein Grund zu erfehen ift.

Der Grund der Erfcheinung ift meines Erachtens ein anderer; es ift einfach die Unipolarität der Ganglienzelle. Damit komme ich zu einem Haupteinwand gegen die Waller'sche Theorie, der wie ich glaube, derfelben jeden Boden entzieht.

Die von der erften Verfuhsreihe gewonnenen fehr reinen Bilder geben mir die Berechtigung unipolare Zellen in den Spinalganglien anzunehmen. Diefc Bilder fallen nämlich auf, einerfeits durch die kleine Anzahl der aus der Ganglion entfpringenden Fafern und andererfeits durch das unveränderte Fortbeftehen der Zellen.

Bedenke man nun Folgendes: Wenn die Ganglienzellen nicht unipolar find, fo können fie bipolar oder multipolar fein, Apolar könnten fie höchstens in verfchwindend kleiner Anzahl fein. Berücksichtigen wir speciell den Fall, in dem fie bipolar find. Die Schlüffe richten fich auch gegen die Annahme von multipolaren. Sind fie bipolar, fo kann zweierlei angenommen werden. Entweder fie find im Verlaufe einer fenfiblen Fafer eingefchaltet, fie gehören factifch den fenfiblen Fafern, oder

sie bestehen unabhängig für sich, indem sie zwei Ausläufer besitzen, von denen der eine nach der Peripherie, der andere nach dem Centrum zieht. (Ueber den Fall, daß die beiden Fortsätze nach der Peripherie ziehen, vergl. S. 29). Im ersten Falle müßten nach Zerstörung der centripetalen Fasern die centrifugalen doch in voller Zahl bestehen, was mit sich bringen würde, daß die austretenden Fasern in ungleich größerer Anzahl sich vorfinden, da die eintretende sensible Wurzel größer ist, als das bei diesen Präparaten austreten zu sehende dünne Bündelchen. Gegen die zweite Annahme stütze ich mich auf den zweiten der oben angeführten Gründe, der selbstverständlich auch gegen die erste Annahme geltend gemacht werden kann. Befasse nämlich die Zelle zwei Ausläufer, so könnte man mit Fug und Recht erwarten, daß die Atrophie des einen Ausläufers bedeutende Veränderungen in der betreffenden Zelle bedingte, wenigstens was die Größe derselben betrifft. Der Umstand aber, daß dies nicht der Fall ist, deutet mit ziemlicher Sicherheit darauf hin, daß die Zelle keinen weitem Ausläufer hat als den peripheren. Daß die Zelle sich gegen die Durchschneidung ihres über alle Zweifel existirenden Ausläufers sich sehr empfindlich verhält, zeigt ihr Zugrundegehen nach peripherer Durchschneidung der Nerven. Man könnte aber einwenden: es ist wahr, daß nach centraler Durchtrennung das Ganglion zu Grunde geht und nach peripherischer erhalten bleibt, das kommt aber daher, daß bei peripherischer Durchschneidung die Zellen des Mittels beraubt werden ihre Function in den peripheren Organen zu entfalten und somit einer Inactivitätsatrophie anheimfallen. Demgegenüber ist aber festzuhalten, daß das Vorhandensein eines Ausläufers nach dem Centrum der sicherste Beweis wäre, daß die Zelle zur Entfaltung ihrer Energie eines Reizes, eines Impulses vom Rückenmark bedarf. Fällt dieser Reiz, dieser Impuls vom Rückenmark bei der centralen Durchschneidung weg, so kann die Zelle nichts mehr

zu Stande bringen; sie ist zur Unthätigkeit verurtheilt und muß daher wiederum an Inactivitätsatrophie zu Grunde gehen. — Dafs die Zelle eigene Lebensfähigkeit besitzt, ist aufer Zweifel; ich wiederhole es aber: den Fall gesetzt, dafs sie mit dem Rückenmark in Verbindung steht, kann man nicht umhin den Bedarf eines Reizes zur Ausführung einer That aufrecht zu erhalten, nach dessen Wegfall die That unterbleibt und wegen Mangels an Erregung Inactivitätsatrophie eintritt. Die Fälle, bei denen die besprochenen Verhältnisse sich zeigten, wären besonders günstig, um Veränderungen in den Ganglien aufzuweisen. Die Kaninchen, die in ihren ersten Lebenstagen der Operation unterworfen wurden, hatten wohl Zeit genug in dem nachfolgenden Monat Veränderungen in den Ganglien zu erleiden, die gar nicht zu übersehen wären. Ebenfalls das Kalb, bei welchem, trotzdem das Ganglion nicht in centraler Verbindung mit dem Trigeminus stand, doch letzteres ganz normale Zellen besafs, was auf die vollkommene Unabhängigkeit derselben hindeutet. Bei Abhängigkeit nämlich des Ganglions vom Trigeminus würde es höchst wahrscheinlich sich gar nicht bilden, oder doch ein kümmerliches Gebilde darstellen. — Dass aber die zu erwartenden Veränderungen nach centraler Durchschneidung nicht eintreffen, ist wohl eine Erhärtung meiner Ansicht.

Nur einer Annahme gegenüber muß ich mein Urtheil zurückhalten, ob nämlich die Spinalganglienzelle zwei Fasern besitzt, die sie beide nach der Peripherie schickt und zwar entweder ursprünglich oder indem die entspringende Faser sich weiter in zwei theilt. Man könnte sich dann vorstellen, dafs die eine derselben irgend einen Reiz von der Peripherie empfängt und der Zelle übermittelt, während die andere die durch die Zelle ausgelöste Action zur Durchführung bringen würde. Vorläufig kann ich dieser Ansicht nicht beitreten, weil mir die aus dem Ganglion austretenden Fasern in zu geringer Anzahl vorzukommen scheinen, als es nothwendig wäre, wenn

alle Zellen zwei Ausläufer nach der Peripherie schicken würden. Dafs beide Fortsätze nach der Peripherie gehen, wurde von Arndt ausgesprochen.

Nachdem ich nun die Zelle als entschieden unipolar*) betrachte, soweit der letztgemachte Einwand keine weitere Bestätigung erfährt, stelle ich sowohl die Ranvier'sche wie die Retzius'sche Annahme in Abrede. Da die erste das Ver-

*) Die sich widersprechenden Angaben über die Resultate bei der Zählung der ein- und austretenden Fasern genügen, um über die Zuverlässigkeit der Methode berechnete Zweifel entstehen zu lassen. Ich möchte nur bemerken, dafs die auffallende Thatfache, wonach die ein- wie austretenden Fasern in gleicher oder annähernd gleicher Anzahl bestehen, selbst wenn sie über alle Zweifel erhoben wäre, keineswegs ein dringender Beweis der Bipolarität der Zelle sein kann, da wohl manches vorkommen kann, welches Einflufs auf die Zählung haben könnte. Schon Axmann gab an, dafs manche Zellen ihren Fortsatz nach der Peripherie schicken, während andere einen nach dem Centrum absenden sollen. Wenn die Anzahl der ersteren so grofs wäre wie die der letzteren, hätten wir nicht dasselbe Resultat? Aber abgesehen von dieser Möglichkeit, kann uns manches überzeugen, dafs die Fasern nicht immer ungeteilt das Ganglion durchgehen, sondern dafs sie manchmal geteilt werden. Das mögen nicht nur die Untersuchungen Freud's deutlich bezeugen, sondern selbst die Angaben von Retzius. Wenn letzterer angibt, dafs er mehrere schmale und mehrere breite Nervenfasern sich theilen sah, so ist es nicht mehr als billig, dafs wir die Zulässigkeit der Annahme zugeben, wonach diese Fasern nicht immer decapitierte Ausläufer, sondern mitunter echte sensible, vom Rückenmark herkommende Fasern gewesen sind. Retzius hat zwar auf die Möglichkeit nicht aufmerksam gemacht, wohl um das Bild des sich theilenden Nervenzellenausläufers nicht zu trüben, sie bleibt aber nichts destoweniger nicht angegeschlossen. Endlich sind die schleifenartigen Bildungen im Nervensystem nicht unbekannt. Das Spinalg. ist fogar der Ort, wo man eine solche sich am leichtesten vorstellen kann. Sollten sensible Fasern schon im Ganglion zur Erzeugung der rückläufigen Sensibilität in die sensible Wurzel eintreten, eine nicht ohne weiteres von der Hand zu weisende Hypothese, so würde man sie oberhalb des Ganglions doppelt zählen, indem zu den austretenden Fasern nothwendigerweise von den Ganglienzellen ein Zuschufs kommen müfste, um das Gleichgewicht in der Anzahl herbeizuführen. Freud macht auch auf eine Anordnung der Fasern im Ganglion des Petromyzon aufmerksam, die bei eventuellen Zählungen zu bedeutenden Irrungen führen könnte. Ich denke, dafs man aus den angeführten, theilweise zum ersten Mal erhobenen Einwänden ersehen kann, dafs die Zählung der Fasern unrichtigerweise von Einigen als das Alleinseligmachende betrachtet und befürwortet wird.

schmelzen der gangliosspinalen Fasern mit den sensiblen an-
nimmt, so folgt daraus, daß bei Durchschneidung und Atro-
phie der sensiblen Wurzel die austretenden Fasern in voller
Zahl bestehen mußten, was doch keineswegs der Fall ist,
weil wie angegeben, sie im Ganzen ein dünnes Bündelchen
darstellen. Allerdings dürfte die Verschmelzung wenigstens
theilweise stattfinden. Was die zweite betrifft, so läßt sie die
Ausläufer die centrale und die peripherische Richtung ein-
schlagen, so daß bei ihr auch die gegen die bipolare Zelle
überhaupt gemachten Einwände erhoben werden können.

Wie ich bemerkt, genügt der Nachweis der Unipolarität
der Zelle, um der Waller'schen Ansicht jeden Boden zu ent-
ziehen. Ich will aber noch einiges anführen, welches gegen
sie spricht.

Der pathologisch-casuistische Beitrag von der Degeneration
der sensiblen Fasern vom Rückenmark bis zum Ganglion und
vom Erhaltenbleiben derselben beim Ausgange aus dem Gang-
lion bei der Tabes kann nicht zu Gunsten der Waller'schen
Ansicht herbeigezogen werden, da sie höchstens den Beweis
liefern könnte, daß die Zelle auf die peripherische Strecke
der Faser eine trophische Einwirkung ausübt, während die
centrale Strecke einer solchen entbehrt; ein Verhältniß welches
sehr complicirt und nicht zu erklären wäre.

Was die analoge Erscheinung bei der peripheren Durch-
schneidung des N. trigem. betrifft, vorausgesetzt daß die Ver-
änderungen auf dem Wegfall der trophischen Einwirkung be-
ruhen, so kann sie ebenfalls nicht zu Gunsten der Waller'schen
Annahme verwerthet werden, da bei derselben die trophische
Einwirkung der ganglionären Fasern nicht auf die peripheren
Gewebe, sondern lediglich auf die Nervenfasern ausgeübt
wird. Waller selbst hat meines Erachtens ein großes Ver-
sehen begangen, als er die trophische Einwirkung des Gang-
lions Gasserii im Sinne Magendie's, und die der Spinalgang-
lien in seinem Sinne zusammengeworfen hat.

Es wäre dann weiter zu bemerken, daß nach der Waller'schen Theorie trophische Einwirkungen Gebilden zugeschrieben werden, die anatomisch sehr von einander abweichen, d. i. den Vorderhornzellen und den Spinalganglienzellen. Abgesehen nämlich einerseits vom Hauptunterschied der Unipolarität und anderseits von andern minder wichtigen Eigenheiten (Kerne der Kapsel etc), so bestehen doch in der Substanz der Zelle selbst große Unterschiede, auf die Flemming aufmerksam gemacht hat. Flemming gibt nämlich an, daß durch die Anwendung von denselben Reagentien und Behandlungsmethoden in den Spinalganglienzellen Fäden, dagegen in den Zellen des centralen Nervensystems eine parallele Streifung hervorgebracht wird. Diese Unterschiede in der histologischen Structur dürften sonderbar erscheinen lassen, wie man beiden Arten von Zellen dieselbe Function hat zuschreiben wollen.

Ich ziehe aus meinen Experimenten folgende Schlüsse: Was den anatomischen Theil betrifft, so halte ich die Spinalganglienzelle für unipolar. Die Unipolarität nehme ich an

- a) weil nach gänzlichem Mangel der centralen Fasern die von dem Ganglion ausgehenden Fasern an Zahl weit zurücktreten,
- b) weil nach Zerstörung der centralen Fasern kein wahrnehmbarer Unterschied in den Zellen zu finden ist.

Dieser auf Grund experimentell-anatomischen Untersuchungen geführter Nachweis wird meines Wissens zum ersten Mal erbracht.

Was den physiologischen Theil anbelangt, so muß ich mich gegen die Annahme Waller's erheben, unbeschadet

aller Hochachtung, die ich einem um die Wissenschaft so hochverdienten Mann schulde.

Die Gründe dafür lauten folgendermassen:

- 1) Die Unipolarität der Spinalganglienzelle.
- 2) Das Erhaltenbleiben des aus den Spinalganglien austretenden Stammes, selbst zu einer Zeit, als die entsprechenden motorischen mit dem angeblich im Rückenmark gelegenen Nährcentrum in Verbindung stehenden Fasern schon zu Grunde gegangen sind, kann durch die trophische Function der Ganglien nicht erklärt werden, sondern muß anderweitig verwerthet werden (vergl. S. 25 u. f.).
- 3) Das Zugrundegehen der Ganglien nach Durchschneidung des peripheren Stammes spricht dagegen. Wäre nämlich das Ganglion das trophische Centrum und entfaltete es seine Wirkung central- wie peripherewärts, so gäbe es keinen Grund zur Atrophie, da es seine Eigenschaften weiter auf die centralen Nervenfasern ausüben müßte.
- 4) Der zu Gunsten der trophischen Function der Spinalganglien gelieferte pathologisch-cauistische Beitrag, weit entfernt ihr wirklich eine Stütze zu verleihen, macht sie noch hypothetischer.
- 5) Die Analogie mit dem Experimente Magendie's beim Trigeminus beruht auf einem Mißverständniß, kann deswegen nicht zu Gunsten der Waller'schen Ansicht verwerthet werden.

Ich bin leider nicht im Stande, an Stelle der widerlegten Waller'schen Ansicht etwas Besseres zu setzen. Wie aber aus der Auseinandersetzung hervorgeht, dürfte die Annahme, daß von den Spinalganglienzellen unabhängige Fasern entspringen, die mit einer, bisher unbekannten Function betraut sind, manches für sich haben. — Der allgemein gefasste Einwand Sigmund Mayer's *) daß es beim gegenwärtigen Stand

*) S. Mayer. Spec. Nervenphysiologie, in Hermann's Handb. d. Phys. Band II, erster Theil.

unserer Nervenphysiologie unzulässig erscheint, peripheren Ganglienzellen centrale Bedeutung zuzuschreiben, fällt meines Erachtens weg, wenn man bedenkt, daß es sich zwar um kleine, aber dennoch in großer Zahl vorkommende constante Gebilde handelt, so daß man ihnen in ihrer Gesamtheit wohl centrale Bedeutung zuschreiben dürfte.

Am Schlusse fühle ich mich verpflichtet, Hrn. Obermedizinalrath v. Gudden meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen für die überaus freundliche Unterstützung, die er mir bei meinen Untersuchungen zu Theil werden liefs.

- 1) Arndt. Ueber die Ganglienkörper der Spinalganglien. Archiv für mik. Anat. 1875.
- 2) Axmann. De Gangliorum systemalis structura penitiori eisque functionibus. Berol. 1847. — Beiträge zur mikrosk. Anat. u. Physiol. des Gangliennervensystems des Menschen und der Wirbelthiere. Mit 22 Abb. Berlin 1853.
- 3) v. Bärensprung. Beiträge zur Kenntniss des Zoster. Charité-Annale 1863. XI.
- 4) Beale, Lionel. Nerve-cells of the frog. Philosoph. Transact. 1863.
- 5) Bidder. Zur Lehre vom Verhältniss der Ganglienkörper zu der Nervenfafer. Leipzig 1847.
- 6) Bidder. Erfolge von Nervendurchschneidung an einem Frosch. Arch. für Anatomie etc. 1865.
- 7) Bichat. Anatomie générale appliquée à la Physiologie, et à la médecine. Deutsche Uebers. Leipzig 1862.
- 8) Bosse. De gangl. spin. vi in nutritione rad. post. nerv. spin. Diss. 1859.
- 9) Courvoisier. Ueber die Zellen der Spinalganglien sowie des Sympath. beim Frosch. Arch. f. mikr. Anat., IV, 1868.
- 10) Duchenne. Comptes rendus 1865.
- 11) Ehrenberg. Structur der Seelenorgane 1836.
- 12) Flemming. Vom Bau der Spinalganglienzellen (In der Festgabe zu Henle's Jubiläum).
- 13) Fräntzel. Beitrag zur Kenntniss von der Struct. der Spinalg. u. des Symp. Virch. Arch. Bd. 38.
- 14) Freud. Ueber Spinalganglien und Rückenmark des Petromyzon. Wiener acad. Sitzungsberichte LXXVIII, II. Abth. Juli-Heft 1878 (Gute Quellenangabe).
- 15) Henle. Nervenlehre (Gute Quellenangabe).
- 16) Holl. Ueber den Bau der Spinalganglien. Wiener acad. Sitzungsberichte LXXII Band III Abth., 1875, Heft I.
- 17) Irsai u. Babes. Wiener medic. Presse 1882, S. 218.
- 18) Key u. Retzius. Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes. Stockholm 1876, 2. Hälfte (Gute Quellenang.) (vgl. 31.)
- 19) Klebs. Med. Centralblatt 1863.
- 20) Krause. Allg. und mikrosk. Anat. 1876—78. Nachträge zum ersten Band. S. 127.
- 21) Kölliker. Handb. der Gewebelehre 1867.
- 22) Lancisi. Epistola ad Morgagnium de Gangliis nervorum.

- 23) Leydig. Vom Bau des thierischen Körpers.
- 24) Lieberkühn. De structura ganglionum penitiori Berol. 1849.
- 25) Luchs. Recherches sur le système nerveux etc. Paris 1865.
- 26) Mauthner. Beiträge zur Kenntniss der morphol. Elem. des Nervensystems. Wien 1862.
- 27) Polaillon. Études sur la texture des Ganglions nerveux periph. Journal de l'anatomie etc. publié par Robin III Année 1866.
- 28) Ranvier. Comptes rendus des séances de l'acad. des sciences 1875 LXXXI p. 1274 — Traité technique d'histologie p. 715.
- 29) Rawitz. Archiv für mikrosk. Anatomie. 18. u. 21. Band.
- 30) Remak. Deutsche Klinik 1854 Nr. 16. — Berliner Monatsberichte 1854.
- 31) Retzius. Archiv f. Anat. u. Phys. 1880 (anat. Abth.)
- 32) Robin. L'Institut 1847, Nr. 687 u. 699.
- 33) Sappey. Anatom. desc. Trois. edit. Tome III p. 419.
- 34) Schäfer. Proceeding of the royal society Nr. 209 p. 348.
- 35) Schramm. Neue Unterf. über den Bau der Spinalg. Inaug.-Differt. Würzburg 1864.
- 36) Schwalbe. Archiv f. mikrosk. Anat. Band 4. — Neurologie (ein Theil der Quain-Hofmann'schen Anatomie).
- 37) Stannius. Das periph. Nervensystem der Fische. Rostock 1849. Neurolog. Erfahr. Göttinger Nachricht. 1851. Nr. 17.
- 38) Stieda. Referate aus der russ. Liter. Arch. f. mikr. Anat. II.
- 39) Stiénon. Annales de l'Univ. libre de Bruxelles 1880. (Referat in Hofmann-Schwalbe's Jahresbericht 1880).
- 40) Thanhoffer. Sitzungsberichte der k. ungar. Akad. d. Wiss. VII, 1876.
- 41) Valentin. Ueber die Scheiden der Ganglienkörper etc. in Müller's Archiv 1839.
- 42) Vieussens. Neurograph. Lehrb. 3 Lugd. 1684.
- 43) Volkmann. Anhang zu Bidder's, Werk 1847.
- 44) Vulpian et Charcol. Comptes rendus de la soc. de biol. 1862.
- 45) Vulpian. Archives de Physiologie. Tome prem. 1868.
- 46) Waller. Comptes rendus XXXIV 1851 (Archives générales 1852).
- Gazette médic. 1856.
- 47) Wägener. Zeitschrift für wiss. Zool. VIII.
- 48) Wagner. Handbuch der Phys. Bd. 3, Abth. I. — Neue Untersuchungen über die Structur der Ganglien.
- 49) Weiss. Anzeigen der K. K. Ges. der Aerzte in Wien Nr. 3 1880.
- 50) Willis. Opera I 1695.
- 51) Winslow. Expof. Anat. de la struct. du corps humain. Paris 1732.

